



COLONOSCOPIA (CON BAREX KIT)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA MAÑANA** (8 - 13 HS)

Lea cuidadosamente y siga las siguientes recomendaciones para un buen resultado de su estudio:

3 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO

Suprimir frutas, verduras crudas, semillas y cereales. Consumir carnes rojas o blancas, arroz y/o fideos. Beber abundantes líquidos no gasificados.

Indicaciones para día previo al estudio:

- Prepare el **BAREX** (diluir por separado cada frasco en un litro de agua). Colóquelo en la heladera.
- **12hs Almuerzo:** Carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). **ÚLTIMA COMIDA SÓLIDA**
- **18hs.** Tome cuatro comprimidos de Bisacodilo con un vaso de agua, sin masticarlos.
- **20hs.** Comience a ingerir el **1 litro de BAREX**, tomando un vaso cada 15 minutos. Tome agua hasta comenzar el segundo frasco.
- A las **00 hs tome el otro litro de BAREX.**



COLONOSCOPIA (CON BAREX KIT)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA MAÑANA** (8 - 13 HS)

RECUERDE:

Puede tomar LÍQUIDOS (solo té, mate, agua) hasta 4 horas antes del estudio (si se realiza VEDA el AYUNO de líquidos también es de 4 hs) NO ingiera SÓLIDOS durante la mañana.

IMPORTANTE

- Como el procedimiento se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto responsable y no podrá conducir vehículos durante las 12 horas posteriores a la realización del examen.
- Por favor, no olvide traer la credencial de su obra social o medicina prepaga, la orden original y consultar en su obra social o medicina prepaga si es necesario autorizar la orden de la práctica a realizar.
- Electrocardiograma con valoración cardiovascular.
- Laboratorio coagulación (APP, KPTT, plaquetas)
- Traer estudios previos: (colonoscopia, colon por enema, etc.) REQUISITO EXCLUYENTE.
- Traer leído y firmado el consentimiento.



COLONOSCOPIA (CON BAREX KIT)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA MAÑANA** (8 - 13 HS)

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

- Si usted toma aspirinas y/o anticoagulantes, debe consultar con su médico para evaluar suspensión días previos al estudio.
- Informar al profesional si Ud. es diabético, tiene insuficiencia cardíaca o renal, o si está embarazada.
- Si toma preparados de hierro es necesario suspenderlos desde 1 semana antes de la colonoscopia.
- Si toma medicamentos para la diabetes, suspéndalos a partir de la última comida sólida previa a la limpieza intestinal hasta después de realizada la colonoscopia, para evitar el riesgo de hipoglucemia.
- Tome su medicación habitual salvo lo señalado anteriormente.