



COLONOSCOPIA (CON BAREX 4 LTS)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA TARDE** (A PARTIR 13 HS)

Lea cuidadosamente y siga las siguientes recomendaciones para un buen resultado de su estudio:

3 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO

Suprimir frutas, verduras crudas, semillas y cereales. Consumir carnes rojas o blancas, arroz y/o fideos. Beber abundantes líquidos no gasificados.

— Día previo al examen

- **Desayuno:** normal
- **Almuerzo:** carnes rojas o blancas (pollo, pescado), arroz o fideos blancos, caldos colados, gelatina, agua saborizada. No ingerir frutas, verduras ni lácteos, ni semillas.
- **Tarde:** luego del almuerzo **no ingerir ningún alimento sólido.**
- **Preparar BAREX CON 4 LITROS DE AGUA.**
- **19 hs** tomar **2 litros de BAREX** (cada 15 minutos, un vaso de 250cc).

Día del examen

- **5:30 AM** tomar té, mate o agua.
- **6:00 AM** tomar los otros **2 litros de BAREX.**



COLONOSCOPIA (CON BAREX 4 LTS)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA TARDE** (A PARTIR 13 HS)

RECUERDE:

Puede tomar LÍQUIDOS (solo té, mate, agua) hasta 4 horas antes del estudio (si se realiza VEDA el AYUNO de líquidos también es de 4 hs) NO ingiera SÓLIDOS durante la mañana.

IMPORTANTE

- Como el procedimiento se realiza con anestesia, debe asistir acompañado por un adulto responsable y no podrá conducir vehículos durante las 12 horas posteriores a la realización del examen.
- Por favor, no olvide traer la credencial de su obra social o medicina prepaga, la orden original y consultar en su obra social o medicina prepaga si es necesario autorizar la orden de la práctica a realizar.
- Electrocardiograma con valoración cardiovascular.
- Laboratorio coagulación (APP, KPTT, plaquetas)
- Traer estudios previos: (colonoscopia, colon por enema, etc.) REQUISITO EXCLUYENTE.
- Traer leído y firmado el consentimiento.



COLONOSCOPIA (CON BAREX 4 LTS)

ESTUDIO A REALIZAR **POR LA TARDE** (A PARTIR 13 HS)

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

- Si usted toma aspirinas y/o anticoagulantes, debe consultar con su médico para evaluar suspensión días previos al estudio.
- Informar al profesional si Ud. es diabético, tiene insuficiencia cardíaca o renal, o si está embarazada.
- Si toma preparados de hierro es necesario suspenderlos desde 1 semana antes de la colonoscopia.
- Si toma medicamentos para la diabetes, suspéndalos a partir de la última comida sólida previa a la limpieza intestinal hasta después de realizada la colonoscopia, para evitar el riesgo de hipoglucemia.
- Tome su medicación habitual salvo lo señalado anteriormente.